

Quiz/Kvíz

A 45-year-old man was investigated because of metastasis of neuroendocrine carcinoma (carcinoid) to the liver. Capsule wireless endoscopy was accomplished in search of the primary tumour. Capsule endoscopy (Fig. 1 on the left) and subsequently enteroscopy (Fig. 2 at right) found an abnormal mucosal pattern in the duodenum (not related directly to carcinoid).

What is your probable diagnosis at endoscopy, which would be confirmed by optical histology?

45letý pacient byl vyšetřován pro jaterní metastázu neuroendokrinního karcinomu (karcinoidu). V rámci pátrání po primárním nádoru byla provedena kapslová endoskopie tenkého střeva. Při kapslové endoskopii (obr. 1 vlevo) a následně enteroskopii (obr. 2 vpravo) byl zjištěn abnormální vzhled sliznice duodena (který není v bezprostředním vztahu ke karcinoidu). Jaká je Vaše pravděpodobná diagnóza při endoskopii, která bude následně potvrzena histologickým vyšetřením?



Fig. 1/Obr. 1



Fig. 2/Obr. 2

The quiz was prepared by Assoc. Professor Marcela Kopáčová, MD, PhD (2nd Department of Medicine, Charles University in Praha, Faculty of Medicine at Hradec Králové, University Teaching Hospital, Hradec Králové).

Please send your answers and possible comments to: kopacmar@fnhk.cz

Kvíz připravila doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové).

Svoje odpovědi a případné komentáře prosím zasílejte na adresu: kopacmar@fnhk.cz